Indicaciones para uso de mascarillas en pacientes sospechosos o confirmados por COVID-19

Precauciones Específicas de Aislamiento por Gotas **Mascarilla quirúrgica (cubrebocas)**	**Precauciones Específicas de Aislamiento Vía Aérea (solo se usaran en estos procedimientos)** **Respirador N95 solo en procedimientos que ocasionan aerosoles**
Si tiene síntomas respiratorios (tos/estornudos/rinorrea) Pacientes o personal de salud	Intubación, extubación, colocación y retiro de mascarilla laríngea, colocación de CPAP, BiPAP, Ventilación Invasiva y no Invasiva, Ventilación con Bolsa Válvula Mascarilla
Cuidador directo de un paciente	Reanimación cardiopulmonar
Personal de salud en contacto con paciente Técnico de radiología Personal dietología Camilleros Personal de ambulancia Personal de limpieza Familiar en contacto con el paciente	Broncoscopia, endoscopia, cirugía
Personal de salud que realiza actividades ocasionales en áreas de pacientes: De electromedicina De mantenimiento De soporte técnico De rehabilitación	Inducción de esputo, nebulizaciones, aspiración de secreciones, Hisopado Nasofaríngeo, Exudado Faríngeo, Autopsia
Recomendaciones: Higiene de manos frecuente, tener cuidado en la colocación y retiro de protección de personal, evitar nebulización e inducción de esputo. PEA de vía aérea consiste en usar N95 UTILIZAR UNA MASCARILLA CUANDO NO ESTA RECOMENDADO CREA UNA SENSACIÓN DE FALSA SEGURIDAD	

Comité de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud. Instituto Nacional de Pediatría. CIAAS INP

Referencia: WHO. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf 19/03/2020

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
INP